

GEWÖHNLICHE BRAUNELLE

Prunella vulgaris



Familie

Lippenblütler (Lamiaceae)

Standort

frische (feuchte) Wiesen und Weiden, Parkrasen

Nutzungsmerkmale

nährstoffreiche Standorte
mittlerer Futterwert

Höhe

5 – 30 cm

Blüte

- Juni – September
- Violett (selten weiß oder rötlich)
- In endständigen Köpfchen
- Blütenröhre gerade, Kronblätter 7-15 mm lang, Oberlippe der Blütenkrone mit gestutzten, ungleichen, stachelspitzigen Zähnen

Blatt

- Blätter länglich-eiförmig
- spärlich behaart

Sonstige Erkennungsmerkmale

- vermehrt sich durch oberirdische Ausläufer

Verwechslungsmöglichkeit

- Mit Großblütiger Braunelle (*Prunella grandiflora*), diese hat jedoch eine gekrümmte Blütenröhre und längere Blütenkronblätter (20-30 mm), Blütenkrone mit gleichen, dreieckigen, zugespitzten Zähnen, Vorkommen auf Halbtrockenrasen, kalkhold

Wissenswertes

- typische Bestäuber: Hautflügler
- Selbstbestäubung erfolgreich
- Junge Pflanzenteile vor der Blüte für Kräutersuppen und Salat verwendbar

TAUSENDKORNGEWICHT:

0,7g

