

KLEINKÖPFIGER PIPPAU

Crepis capillaris

Familie

Korbblütler (Asteraceae)

Standort

etwas magere, mäßig trockene bis frisch Wiesen und Weiden, Parkrasen und Ruderalstellen

Nutzungsmerkmale

Auf mäßig nährstoff- und basenreichen, meist kalkarmen Standorten

Höhe

5 – 60 cm

Blüte

- Juni-September
- Stengel vielköpfig, Blütenköpfchen klein (10-15 mm breit)
- Blüten goldgelb, unterseits oft rötlich
- nur mit Zungenblüten
- Hüllblätter 2-reihig

Blatt

- Blätter überwiegend grundständig, unregelmäßig fiederspaltig, aber auch Stengelblätter vorhanden, diese mit meist geschlitztem Öhrchen stengelumfassend

Sonstige Erkennungsmerkmale

- Milchsafführend (Unterfamilie Cichorioideae) Verwechslungsmöglichkeit mit vielen ähnlich aussehenden gelbblühenden Korbblütlern. Der nahverwandte, zweijährige *Crepis biennis* wird insgesamt deutlich höher (50-1,20 cm) und das Blütenkörbchen breiter (25-35 mm), die Kronblätter sind unterseits nicht rot

Wissenswertes

- Insektenbestäubung (Fliegen, Bienen)
- Körbchen innen mit geringer, außen mit hoher UV-Reflexion, daher Bestäubern zweifarbig erscheinend
- Pionierpflanze, einjährig
- Alteinwanderer (Archäophyt)

TAUSENDKORNGEWICHT:

0,3g

