

WIESEN-BOCKSBART

(Artengruppe)

Tragopogon pratensis (agg.)



Familie

Korbblütengewächse (Asteraceae)

Standort

frische bis trockene Wiesen

Nutzungsmerkmale

empfindlich gegenüber Beweidung

Höhe

30–60 cm

Blüte

- Mai bis Juli
- hellgelbes bis goldgelbes Blütenköpfchen aus zahlreichen Zungenblüten zusammengesetzt
- blüht morgens, schließt sich um die Mittagszeit

Blatt

- grasartig
- blaugrün
- stängelumfassend

Sonstige Erkennungsmerkmale

- aufrechter Stängel mit endständiger Blüte
- bildet Schirmchen nach der Blüte; „Riesen-Pusteblume“ bis zu 8 cm breit
- Die Samen hängen an kleinen Schirmchen zur Verbreitung durch den Wind.
- braune Pfahlwurzel mit Milchsaft



Verwechslungsmöglichkeit

- Innerhalb der Korbblütengewächse gibt es viele schwer unterscheidbare gelb blühende Artengruppen.

Wissenswertes

- Der Name „Bocksbart“ bezieht sich auf die langen weißen Haare des Früchtchens im geschlossenen Blütenstand.
- Die Wurzel ist essbar und kann wie Schwarzwurzeln zubereitet werden.

TAUSENDKORNGEWICHT:

76

